

R.G.A.

Rede Galega de Aerobioloxía


PREDICIÓN DE POLE DOS TAXA MÁIS REPRESENTATIVOS

Semana do 8 ó 15 de maio de 2022




Estrugas

Niveis baixos	(1-15 grans de pole/m ³ de aire)
Niveis moderados	(16-30 grans de pole/m ³ de aire)
Niveis altos	(>30 grans de pole/m ³ de aire)




Carballos

Niveis baixos	(1-50 grans de pole/m ³ de aire)
Niveis moderados	(51-200 grans de pole/m ³ de aire)
Niveis altos	(>200 grans de pole/m ³ de aire)



Chantaxe y Gramíneas

Niveis baixos	(1-15 grans de pole/m ³ de aire)
Niveis moderados	(16-30 grans de pole/m ³ de aire)
Niveis altos	(>30 grans de pole/m ³ de aire)



Bidueiros

Niveis baixos	(1-30 grans de pole/m ³ de aire)
Niveis moderados	(31-50 grans de pole/m ³ de aire)
Niveis altos	(>50 grans de pole/m ³ de aire)

Para os próximos días espérase un incremento das temperaturas ata a fin de semana, momento no cal comezará unha situación de inestabilidade atmosférica, o cal provocará un descenso das temperaturas e tormentas no interior de Galicia. Por todo isto, é de esperar que a concentración de pole na atmosfera irá aumentando ata o venres e despois diminuírá no interior do territorio debido ás choivas e ao descenso térmico.

En primeiro lugar, os bidueiros están a piques de rematar a súa floración en toda a Comunidade, polo que os seus niveis comezarán a diminuír, especialmente no sur do territorio. Por outro lado, as concentracións polínicas dos carballos acadarán valores xeralmente moderados en toda Galicia, podendo chegar a baixos durante o fin de semana nas áreas interiores. En canto ás oliveiras, a súa floración estase a iniciar principalmente na comarca de Vigo, podendo acadar puntualmente niveis moderados, aínda que no resto de Galicia estes serán baixos.

Respecto ás plantas herbáceas, dende o punto de vista alerxénico son de gran importancia, as súas concentracións irán aumentando nas vindeiras semanas. O pole de estrugas continuará a rexistrar valores altos en toda a costa atlántica e puntualmente no sur da Comunidade. Por outra parte, espéranse incrementos progresivos na concentración de gramíneas, chantaxe, acedas e queirugas.